

膵臓がん

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
GEM 〈28〉	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
S1+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 分2:朝夕食後	1,8 1-14	
FOLFIRINOX 〈14〉	オキサリプラチン注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注	85 mg/m ² 200 mg/m ² 150 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 1時間30分 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン同時 投与 (レボホリナート開始30分後 イリノテカン開始)
weekly nabPTX+GEM 〈28〉	nabパクリタキセル注 ゲムシタビン注	125 mg/m ² 1000 mg/m ²	30分 30分	1,8,15 1,8,15	
nal-IRI+5-FU/LV 〈14〉	nalイリノテカン注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	70 mg/m ² 200 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 46時間	1 1 1-3	