

非小細胞肺癌①

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
PEM 〈21〉	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
DTX 〈21〉	ドセタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1	
triweekly PTX 〈21〉	パクリタキセル注	210 mg/m ²	3時間	1	
weekly PTX 〈28〉	パクリタキセル注	70 mg/m ²	1時間	1,8,15	
weekly nabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
GEM 〈28〉	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
VNR 〈28〉	ビノレルビン注	25 mg/m ²	全開で自然滴下	1,8,15	
weekly CPT-11 〈28〉	イリノテカン注	100 mg/m ²	1時間30分	1,8,15	
AMR 〈28〉	アムルビシン注	45 mg/m ²	全開で自然滴下	1,2,3	
CBDCA+PEM 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/m ² AUC=6	10分 1時間	1 1	
CBDCA+PTX 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/m ² AUC=6	3時間 1時間	1 1	
CBDCA+weekly PTX 〈28〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注	70 mg/m ² AUC=6	1時間 1時間	1,8,15 1	
CBDCA +weekly nabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	100 mg/m ² AUC=6	30分 1時間	1,8,15 1	
CBDCA+DTX 〈21〉	ドセタキセル注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間 1時間	1 1	
CBDCA+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 カルボプラチン注	1000 mg/m ² AUC=5	30分 1時間	1,8 1	
CBDCA+VNR 〈21〉	ビノレルビン注 カルボプラチン注	25 mg/m ² AUC=5	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CBDCA+CPT-11 〈28〉	イリノテカン注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間30分 1時間	1,8,15 1	

非小細胞肺がん②

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+S1 〈21〉	カルボプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 80 mg/m ²	1時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/m ² 75 mg/m ²	10分 1時間	1 1	
CDDP+GEM (short-hydration) 〈21〉	ゲムシタビン注 シスプラチン注	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 1時間	1,8 1	
CDDP+VNR (short-hydration) 〈21〉	ビノレルビン注 シスプラチン注	25 mg/m ² 80 mg/m ²	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
S1+CDDP (short-hydration) 〈35〉	シスプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	60 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間 分2:朝夕食後	8 1-21 (3投2休)	
Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+PEM 〈21〉	ペトレキセド注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² 15 mg/kg	10分 1時間30分	1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Gefitinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 ゲフィチニブ	15 mg/kg 250 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
DTX+Bevacizumab 〈21〉	ドセタキセル注 ベバシズマブ注	50 mg/m ² 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Erlotinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 エルロチニブ	15 mg/kg 150 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Afatinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 アフアチニブ	15 mg/kg 40 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+nabPTX 〈21〉	ベバシズマブ注 nabパクリタキセル注	15 mg/kg 100 mg/m ²	1時間30分 30分	1 1,8,15	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+ CBDCA+PTX 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	200 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	3時間 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+ CBDCA+PEM 〈21〉	ペトレキセド注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+ CBDCA+S1 〈21〉	カルボプラチン注 ベバシズマブ注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 15 mg/kg 80 mg/m ²	1時間 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可

非小細胞肺癌③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
nabPTX+CBDCA+ Bevacizumab+ 〈21〉	ベバシズマブ注 nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	15 mg/kg 100 mg/m ² AUC=6	1時間30分 30分 1時間	1 1,8,15 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab +CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ベバシズマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	15 mg/kg 500 mg/m ² 75 mg/m ²	1時間30分 10分 1時間	1 1 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+ CDDP+GEM (short-hydration) 〈21〉	ベバシズマブ注 ゲムシタビン注 シスプラチン注	15 mg/kg 1000 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 30分 1時間	1 1,8 1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Ramucirumab+DTX 〈21〉	ラムシルマブ注 ドセタキセル注	10 mg/kg 60 mg/m ²	1時間 1時間	1 1	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
Ramucirumab+Gefitinib 〈14〉	ラムシルマブ注 ゲフィチニブ	10 mg/kg 250 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
Ramucirumab+Erlotinib 〈14〉	ラムシルマブ注 エルロチニブ	10 mg/kg 150 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
S1+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	1000 mg/m ² 60 mg/m ²	30分 分2:朝夕食後	8,15 1-14	
GEM+VNR 〈28〉	ビノレルビン注 ゲムシタビン注	25 mg/m ² 1000 mg/m ²	全開で自然滴下 30分	1,8,15 1,8,15	

非小細胞肺癌④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Nivolumab q2weeks 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab q4weeks 〈28〉	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab q3weeks 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab q6weeks 〈42〉	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	30分	1	
Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	2回目以降30分に短縮可
Durzalumab 〈14〉	デュルバルマブ注	10 mg/kg	1時間	1	
Nivolumab(q2weeks)+ Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Nivolumab(q3weeks) +Ipilimumab 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	
Pembrolizumab+CBDCA +weekly nabPTX 〈21〉	ペムブロリズマブ注 nab/パクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/body 100 mg/m ² AUC=6	30分 30分 1時間	1 1,8,15 1	
Nivolumab+Ipilimumab +CBDCA+PTX 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注 パクリタキセル注 カルボプラチン注	360 mg/body 1 mg/kg 200 mg/m ² AUC=6	30分 30分 3時間 1時間	1,22 1 1,22 1,22	
Pembrolizumab +CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	200 mg/body 500 mg/m ² 75 mg/m ²	30分 10分 1時間	1 1 1	
Pembrolizumab +CBDCA+PEM 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注 カルボプラチン注	200 mg/body 500 mg/m ² AUC=5	30分 10分 1時間	1 1 1	
Pembrolizumab+PEM 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注	200 mg/body 500 mg/m ²	30分 10分	1 1	
ABPC (Atezolizumab+Bevacizu mab+PTX+CBDCA) 〈21〉	アテゾリズマブ注 ベバシズマブ注 パクリタキセル注 カルボプラチン注	1200 mg/body 15 mg/kg 200 mg/m ² AUC=6	1時間 1時間30分 3時間 1時間	1 1 1 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可

非小細胞肺がん⑤

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Atezolizumab+CBDCA +weekly nabPTX 〈21〉	アテゾリズマブ注 nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	1200 mg/body 100 mg/m ² AUC=6	1時間 30分 1時間	1 1,8,15 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Atezolizumab +CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	アテゾリズマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	1200 mg/body 500 mg/m ² 75 mg/m ²	1時間 10分 1時間	1 1 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Atezolizumab +CBDCA+PEM 〈21〉	アテゾリズマブ注 ペメトレキセド注 カルボプラチン注	1200 mg/body 500 mg/m ² AUC=6	1時間 10分 1時間	1 1 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Atezolizumab+PEM 〈21〉	アテゾリズマブ注 ペメトレキセド注	1200 mg/body 500 mg/m ²	1時間 10分	1 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
Nivolumab+Ipilimumab +CDDP+PEM (short-hydration) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	360 mg/body 1 mg/kg 500 mg/m ² 75 mg/m ²	30分 30分 10分 1時間	1,22 1 1,22 1,22	
Nivolumab+Ipilimumab +CBDCA+PEM 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注 ペメトレキセド注 カルボプラチン注	360 mg/body 1 mg/kg 500 mg/m ² AUC=6	30分 30分 10分 1時間	1,22 1 1,22 1,22	
Atezolizumab +Bevacizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注 ベバシズマブ注	1200 mg/body 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可