

Bevacizumab単独・併用(卵巣がん・子宮体がん・子宮頸がん・子宮内膜がん・肉腫等)

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Bevcizumab (21)	ベバシズマブ注	15 mg/kg	30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
TC+Bevcizumab (21)	パクリタキセル注	175 mg/m ²	3時間	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
ddTC+Bevcizumab (21)	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
weekly TC+Bevcizumab (28)	パクリタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1,8,15	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=2	1時間	1,8,15	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
DC+Bevcizumab (21)	ドセタキセル注	75 mg/m ²	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
DG+Bevcizumab (21)	ゲムシタビン注	800 mg/m ²	30分	1,8	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
	ドセタキセル注	70 mg/m ²	1時間30分	8	
GC+Bevcizumab (21)	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=4	1時間	1	
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
PLDC+Bevcizumab (28)	ドキソリホソール注	30 mg/m ²	1時間	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
	ベバシズマブ注	10 mg/kg	1時間30分	1,15	
PLD+Bevcizumab (28)	ドキソリホソール注	40 mg/m ²	2時間	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	10 mg/kg	1時間30分	1,15	
weeklyCPT-11 +Bevcizumab (28)	イリノテカン注	100 mg/m ²	1時間30分	1,8,15	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	10 mg/kg	1時間30分	1,15	