

胃がん①

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
S1+CDDP(SP) <35>	シスプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	60 mg/m ² 80 mg/m ²	3時間 分2:朝夕食後	8 1-21	day7～ ハイドレーション
Cape+CDDP(XP) <21>	シスプラチン注 カペシタビン	80 mg/m ² 2000 mg/m ²	3時間 分2:朝夕食後	2 2-15	day1～ ハイドレーション
SOX(胃癌) <21>	オキサリプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	130 mg/m ² 80 mg/m ²	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
CAPOX(胃癌) <21>	オキサリプラチン注 カペシタビン	130 mg/m ² 2000 mg/m ²	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
mFOLFOX6 <14>	レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
S1+DTX <21>	ドセタキセル注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	40 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
S1+IRI <35>	イリノテカン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1,15 1-21	
weekly PTX <28>	パクリタキセル注	80 mg/m ²	1時間	1,8,15	
weekly nabPTX <28>	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
weekly IRI <28>	イリノテカン注	100 mg/m ²	1時間30分	1,8,15	
biweekly IRI <28>	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1,15	

胃がん②

レジメン名 (クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Ramucirumab <14>	ラムシルマブ注	8 mg/kg	1時間	1	ラムシルマブ： 2回目以降30分に短縮可
weekly PTX+ Ramucirumab <28>	ラムシルマブ注 パクリタキセル注	8 mg/kg 80 mg/m ²	1時間 1時間	1,15 1,8,15	ラムシルマブ： 2回目以降30分に短縮可
IRI+ Ramucirumab <14>	ラムシルマブ注 イリノテカン注	8 mg/kg 150 mg/m ²	1時間 1時間30分	1 1	ラムシルマブ： 2回目以降30分に短縮可
Cape+CDDP+ Trastuzumab (1クール目) <21>	トラスツズマブ注 シスプラチニン注 カペシタビン	8 mg/kg 80 mg/m ² 2000 mg/m ²	1時間30分 3時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
Cape+CDDP+ Trastuzumab (2クール目以降) <21>	トラスツズマブ注 シスプラチニン注 カペシタビン	6 mg/kg 80 mg/m ² 2000 mg/m ²	30分 3時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
S1+DTX+Trastuzumab (1クール目) <21>	トラスツズマブ注 ドセタキセル注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	8 mg/kg 40 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 1時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
S1+DTX+Trastuzumab (2クール目以降) <21>	トラスツズマブ注 ドセタキセル注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	6 mg/kg 40 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 1時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
SOX+Trastuzumab (1クール目) <21>	トラスツズマブ注 オキサリプラチニン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	8 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
SOX+Trastuzumab (2クール目) <21>	トラスツズマブ注 オキサリプラチニン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	6 mg/kg 130 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
CAPOX+Trastuzumab (1クール目) <21>	トラスツズマブ注 オキサリプラチニン注 カペシタビン	8 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
CAPOX+Trastuzumab (2クール目) <21>	トラスツズマブ注 オキサリプラチニン注 カペシタビン	6 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
T-DXd <21>	トラスツズマブ デルクステカン注	6.4 mg/kg	1時間30分	1	トラスツズマブデルクステカン： 2回目以降30分に短縮可

胃がん③

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Nivolumab(q2weeks) <14>	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) <28>	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	
SOX+Nivolumab <21>	ニボルマブ注 オキサリプラチニン注 テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	360 mg/body 130 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
CAPOX+Nivolumab <21>	ニボルマブ注 オキサリプラチニン注 カペシタビン	360 mg/body 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
mFOLFOX6+Nivolumab <14>	ニボルマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	240 mg/body 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与
CAPOX+Zolbetuximab <21>	ゾルベツキシマブ注 オキサリプラチニン注 カペシタビン	600 mg/m ² 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	約120~210分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	
mFOLFOX6+Zolbetuximab <14>	ゾルベツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	400 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	約100~150分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与
Cape+Zolbetuximab <21>	ゾルベツキシマブ注 カペシタビン	600 mg/m ² 2000 mg/m ²	約120~210分 分2:朝夕食後	1 1-14	
sLV5FU2+Zolbetuximab <14>	ゾルベツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	400 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	約100~150分 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与