

## 胃がん①

| レジメン名<br>(1クール日数)     | 薬品名   | 投与量  | 点滴時間<br>用法                  | 投与日(day)           | 備考                       |
|-----------------------|---|--|-----------------------------|--------------------|--------------------------|
| SOX<br>(21)           | オキサリプラチン注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合            | 130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body  | 2時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1-14          |                          |
| CAPOX<br>(21)         | オキサリプラチン注<br>カペシタビン                             | 130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 2時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1-14          |                          |
| mFOLFOX6<br>(14)      | レボホリナート注<br>オキサリプラチン注<br>フルオロウラシル注<br>フルオロウラシル注 | 200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2400 mg/m <sup>2</sup> | 2時間<br>2時間<br>全開で投与<br>46時間 | 1<br>1<br>1<br>1-3 | レボホリナート・オキサリプラチン<br>同時投与 |
| S1+DTX<br>(21)        | ドセタキセル注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合              | 40 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body   | 1時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1-14          |                          |
| S1+IRI<br>(35)        | イリノテカン注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合              | 80 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body   | 1時間30分<br>分2:朝夕食後           | 1,15<br>1-21       |                          |
| weekly PTX<br>(28)    | パクリタキセル注  | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 1時間                         | 1,8,15             |                          |
| weekly nabPTX<br>(28) | nab/パクリタキセル注                                    | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 30分                         | 1,8,15             |                          |
| weekly IRI<br>(28)    | イリノテカン注   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                      | 1,8,15             |                          |
| biweekly IRI<br>(28)  | イリノテカン注   | 150 mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分                      | 1,15               |                          |

胃がん②

| レジメン名<br>(1クール日数)                              | 薬品名  | 投与量  | 点滴時間<br>用法               | 投与日(day)       | 備考                               |
|--|--|--|--------------------------|----------------|----------------------------------|
| Ramucirumab<br><14>                            | ラムシリマブ注  | 8 mg/kg  | 1時間                      | 1              | ラムシリマブ：<br>2回目以降30分に短縮可          |
| weekly PTX+<br>Ramucirumab<br><28>             | ラムシリマブ注<br>パクリタキセル注                              | 8 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup>                            | 1時間<br>1時間               | 1,15<br>1,8,15 | ラムシリマブ：<br>2回目以降30分に短縮可          |
| IRI+<br>Ramucirumab<br><14>                    | ラムシリマブ注<br>イリノテカン注                               | 8 mg/kg<br>150 mg/m <sup>2</sup>                           | 1時間<br>1時間30分            | 1<br>1         | ラムシリマブ：<br>2回目以降30分に短縮可          |
| Cape+CDDP+<br>Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>   | トラスツズマブ注<br>シスプラチニ注<br>カペシタビン                    | 8 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 1時間30分<br>3時間<br>分2:朝夕食後 | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| Cape+CDDP+<br>Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21> | トラスツズマブ注<br>シスプラチニ注<br>カペシタビン                    | 6 mg/kg<br>80 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 30分<br>3時間<br>分2:朝夕食後    | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| S1+DTX+Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>          | トラスツズマブ注<br>ドセタキセル注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合   | 8 mg/kg<br>40 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body          | 1時間30分<br>1時間<br>分2:朝夕食後 | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| S1+DTX+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21>        | トラスツズマブ注<br>ドセタキセル注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合   | 6 mg/kg<br>40 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body          | 30分<br>1時間<br>分2:朝夕食後    | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| SOX+Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>             | トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合 | 8 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body         | 1時間30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後 | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| SOX+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21>           | トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合 | 6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body         | 30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後    | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| CAPOX+Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>           | トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                  | 8 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup> | 1時間30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後 | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| CAPOX+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21>         | トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                  | 6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup> | 30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後    | 1<br>1<br>1-14 |                                  |
| T-DXd<br><21>                                  | トラスツズマブ<br>デルクスステカン注                             | 6.4 mg/kg  | 1時間30分                   | 1              | トラスツズマブデルクスステカン：<br>2回目以降30分に短縮可 |

胃がん③

| レジメン名<br>(1クール日数)                         | 薬品名  | 投与量   | 点滴時間<br>用法                         | 投与日(day)                | 備考                       |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| mFOLFOX6+Trastuzumab<br>(1クール目)<br>(42)   | トラスツズマブ注   | 8 mg/kg   | 1時間30分                             | 1                       |                          |
|   | トラスツズマブ注   | 6 mg/kg   | 30分                                | 22                      |                          |
|   | レボホリナート注   | 200 mg/m <sup>2</sup>   | 2時間                                | 1,15,29                 | レボホリナート・オキサリプラチ<br>ン同時投与 |
|   | オキサリプラチニン注   | 85 mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                                | 1,15,29                 |                          |
|   | フルオロウラシル注  | 400 mg/m <sup>2</sup>   | 全開で投与                              | 1,15,29                 |                          |
|   | フルオロウラシル注  | 2400 mg/m <sup>2</sup>  | 46時間                               | 1-3,15-17,<br>29-31     |                          |
| mFOLFOX6+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br>(42) | トラスツズマブ注   | 6 mg/kg   | 30分                                | 1,22                    |                          |
|   | レボホリナート注   | 200 mg/m <sup>2</sup>   | 2時間                                | 1,15,29                 | レボホリナート・オキサリプラチ<br>ン同時投与 |
|   | オキサリプラチニン注   | 85 mg/m <sup>2</sup>  | 2時間                                | 1,15,29                 |                          |
|   | フルオロウラシル注  | 400 mg/m <sup>2</sup>   | 全開で投与                              | 1,15,29                 |                          |
|   | フルオロウラシル注  | 2400 mg/m <sup>2</sup>  | 46時間                               | 1-3,15-17,<br>29-31     |                          |
| Nivolumab(q2weeks)<br>(14)                | ニボルマブ注   | 240 mg/body   | 30分                                | 1                       |                          |
| Nivolumab(q4weeks)<br>(28)                | ニボルマブ注   | 480 mg/body   | 30分                                | 1                       |                          |
| SOX+Nivolumab<br>(21)                     | ニボルマブ注<br>オキサリプラチニン注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合            | 360 mg/body<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body  | 30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1<br>1-14          |                          |
| CAPOX+Nivolumab<br>(21)                   | ニボルマブ注<br>オキサリプラチニン注<br>カペシタビン                             | 360 mg/body<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1<br>1-14          |                          |
| mFOLFOX6+Nivolumab<br>(14)                | ニボルマブ注<br>レボホリナート注<br>オキサリプラチニン注<br>フルオロウラシル注<br>フルオロウラシル注 | 240 mg/body<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2400 mg/m <sup>2</sup> | 30分<br>2時間<br>2時間<br>全開で投与<br>46時間 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1-3 | レボホリナート・オキサリプラチ<br>ン同時投与 |
| S1+Nivolumab<br>(21)                      | ニボルマブ注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合                          | 360 mg/body<br>80-120 mg/body   | 30分<br>分2:朝夕食後                     | 1<br>1-14               |                          |
| Cape+Nivolumab<br>(21)                    | ニボルマブ注<br>カペシタビン   | 360 mg/body<br>2000 mg/m <sup>2</sup>   | 30分<br>分2:朝夕食後                     | 1<br>1-14               |                          |
| sLV5FU2+Nivolumab<br>(14)                 | ニボルマブ注<br>レボホリナート注<br>フルオロウラシル注<br>フルオロウラシル注               | 240 mg/body<br>200 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2400 mg/m <sup>2</sup>                         | 30分<br>2時間<br>全開で投与<br>46時間        | 1<br>1<br>1<br>1-3      |                          |

胃がん④

| レジメン名<br>(1クール日数)  | 薬品名   | 投与量   | 点滴時間<br>用法                               | 投与日(day)                | 備考                       |
|--|---|---|--|-------------------------|--------------------------|
| SOX+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>     | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合 | 200 mg/body<br>8 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body   | 30分<br>1時間30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後          | 1<br>1<br>1<br>1-14     |                          |
| SOX+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21>   | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>テガフル・キメラシル・<br>オテラシルK配合 | 200 mg/body<br>6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>80-120 mg/body   | 30分<br>30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後             | 1<br>1<br>1<br>1-14     |                          |
| S1+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(維持療法)<br><21>       | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                  | 200 mg/body<br>6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>   | 30分<br>30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後             | 1<br>1<br>1<br>1-14     |                          |
| CAPOX+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(1クール目)<br><21>   | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                  | 200 mg/body<br>8 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>   | 30分<br>1時間30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後          | 1<br>1<br>1<br>1-14     |                          |
| CAPOX+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(2クール目以降)<br><21> | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                  | 200 mg/body<br>6 mg/kg<br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>   | 30分<br>30分<br>2時間<br>分2:朝夕食後             | 1<br>1<br>1<br>1-14     |                          |
| Cape+Pembrolizumab<br>+Trastuzumab<br>(維持療法)<br><21>     | ペムブロリズマブ注<br>トラスツズマブ注<br>カペシタビン                               | 200 mg/body<br>6 mg/kg<br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 30分<br>30分<br>分2:朝夕食後                    | 1<br>1<br>1-14          |                          |
| CAPOX+Zolbetuximab<br><21>                               | ゾルベツキシマブ注<br>オキサリプラチニ注<br>カペシタビン                              | 600 mg/m <sup>2</sup><br>130 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>  | 約120~210分<br>2時間<br>分2:朝夕食後              | 1<br>1<br>1-14          |                          |
| mFOLFOX6+Zolbetuximab<br><14>                            | ゾルベツキシマブ注<br>レボホリナート注<br>オキサリプラチニ注<br>フルオロウラシル注<br>フルオロウラシル注  | 400 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>85 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2400 mg/m <sup>2</sup> | 約100~150分<br>2時間<br>2時間<br>全開で投与<br>46時間 | 1<br>1<br>1<br>1<br>1-3 | レボホリナート・オキサリプラチニ<br>同時投与 |
| Cape+Zolbetuximab<br><21>                                | ゾルベツキシマブ注<br>カペシタビン   | 600 mg/m <sup>2</sup><br>2000 mg/m <sup>2</sup>   | 約120~210分<br>分2:朝夕食後                     | 1<br>1-14               |                          |
| sLV5FU2+Zolbetuximab<br><14>                             | ゾルベツキシマブ注<br>レボホリナート注<br>フルオロウラシル注<br>フルオロウラシル注               | 400 mg/m <sup>2</sup><br>200 mg/m <sup>2</sup><br>400 mg/m <sup>2</sup><br>2400 mg/m <sup>2</sup>                         | 約100~150分<br>2時間<br>全開で投与<br>46時間        | 1<br>1<br>1<br>1-3      | レボホリナート・オキサリプラチニ<br>同時投与 |