

胆道がん

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
GEM <28>	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
CDDP+GEM <21>	シスプラチン注 ゲムシタビン注	25 mg/m ² 1000 mg/m ²	1時間 30分	1,8 1,8	
GCS <14>	シスプラチン注 ゲムシタビン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	25 mg/m ² 1000 mg/m ² 80-120 mg/body	1時間 30分 分2:朝夕食後	1 1 1-7	
GS <21>	ゲムシタビン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	1000 mg/m ² 60-100 mg/body	30分 分2:朝夕食後	1,8 1-14	
CDDP+GEM+ Durvalumab <21>	デュルバルマブ注 シスプラチン注 ゲムシタビン注	1500 mg/body 25 mg/m ² 1000 mg/m ²	1時間 1時間 30分	1 1,8 1,8	デュルバルマブ:体重≤30kg の場合20mg/kg
Durvalumab(維持療法) <28>	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	デュルバルマブ:体重≤30kg の場合20mg/kg