

大腸がん①

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mFOLFOX6 (14)	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
CAPOX (21)	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	1夕-15朝
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後		
SOX (21)	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	1夕-14
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後		
FOLFIRI (14)	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mCAPIRI (21)	イリノテカン注	200 mg/m ²	1時間30分	1	1夕-15朝
	カペシタビン	1600 mg/m ²	分2:朝夕食後		
sLV5FU2 (14)	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	1夕-15朝
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Aflibercept+FOLFIRI (14)	アフリベルセプト注	4 mg/kg	1時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Bevacizumab +mFOLFOX6 (14)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Bevacizumab+CAPOX (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1夕-15朝	
Bevacizumab+SOX (21)	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1夕-14	
Bevacizumab+FOLFIRI (14)	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	

大腸がん②

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Bevacizumab+mCAPIRI (21)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m ² 1600 mg/m ²	1時間30分 1時間 分2:朝夕食後	1 1 1夕-15朝	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SIRB (21)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 150 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+sLV5FU2 (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab +Capecitabine (21)	ベバシズマブ注 カペシタビン	7.5 mg/kg 2000 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1夕-15朝	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab+S1 (21)	ベバシズマブ注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 80 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab +FOLFOXIRI (導入療法) (14)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 オキサリプラチン注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	1時間30分 1時間 2時間 2時間 48時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチン・レボホリナート 同時投与
Bevacizumab +FOLFOXIRI (維持療法) (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	30分 2時間 48時間	1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Bevacizumab +TAS102 (28)	ベバシズマブ注 トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩	5 mg/kg 35 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1,15 1-5,8-12	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
biweekly Cetuximab (①クール目) (14)	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
biweekly Cetuximab (②以降) (14)	セツキシマブ注	500 mg/m ²	1時間	1	
biweekly Cetuximab +CPT-11 (①クール目) (14)	セツキシマブ注 イリノテカン注	500 mg/m ² 150 mg/m ²	2時間 1時間30分	1 1	

大腸がん③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
biweekly Cetuximab +CPT-11 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	1時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	
biweekly Cetuximab +FOLFIRI (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
biweekly Cetuximab +FOLFIRI (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	1時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
biweekly Cetuximab +mFOLFOX6 (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
biweekly Cetuximab +mFOLFOX6 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	1時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
biweekly Cetuximab +sLV5FU2 (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
biweekly Cetuximab +sLV5FU2 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	1時間	1	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Cetuximab(①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	
Cetuximab(②以降) 〈7〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1	
Cetuximab+CPT-11 (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	
	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	8	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	
Cetuximab+CPT-11 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1,8	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	

大腸がん④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考	
Cetuximab+FOLFIRI (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与	
	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	8		
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+FOLFIRI (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1,8	レボホリナート・イリノテカン 同時投与	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+mFOLFOX6 (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与	
	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	8		
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+mFOLFOX6 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1,8	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+sLV5FU2 (①クール目) 〈14〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1		
	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	8		
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+sLV5FU2 (②以降) 〈14〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1,8		
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1		
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1		
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3		
Cetuximab+ Encorafenib+Binimetinib (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1		
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用		
	ビニメチニブ	90 mg	分2:朝夕食後	連日服用		
Cetuximab+ Encorafenib+Binimetinib (②クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1		
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用		
	ビニメチニブ	90 mg	分2:朝夕食後	連日服用		

大腸がん⑤

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Cetuximab+Encorafenib (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	400 mg/m ² 300 mg	2時間 分1:朝食後	1 連日服用	
Cetuximab+Encorafenib (②クール目) 〈7〉	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	250 mg/m ² 300 mg	1時間 分1:朝食後	1 連日服用	
Panitumumab 〈7〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
Panitumumab+CPT-11 〈14〉	パニツムマブ注 イリノテカン注	6 mg/kg 150 mg/m ²	1時間 1時間30分	1 1	
Panitumumab +mFOLFOX6 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
Panitumumab+FOLFIRI 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	
Panitumumab+sLV5FU2 〈14〉	パニツムマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
Ramucirumab+FOLFIRI 〈14〉	ラムシルマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可