

大腸がん①

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mFOLFOX6 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
CAPOX 〈21〉	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
SOX 〈21〉	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
FOLFIRI 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mCAPIRI 〈21〉	イリノテカン注	200 mg/m ²	1時間30分	1	
	カペシタビン	1600 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
sLV5FU2 〈14〉	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
FOLFIRI+Aflibercept 〈14〉	アフリベルセプト注	4 mg/kg	1時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mFOLFOX6+ Bevacizumab 〈14〉	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
CAPOX+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	カペシタビン	2000 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
SOX+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	7.5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	オキサリプラチン注	130 mg/m ²	2時間	1	
	テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	80 mg/m ²	分2:朝夕食後	1-14	
FOLFIRI+Bevacizumab 〈14〉	ベバシズマブ注	5 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	

大腸がん②

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mCAPIRI+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 イリノテカン注 カペシタビン	7.5 mg/kg 200 mg/m ² 1600 mg/m ²	1時間30分 1時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SIRB 〈21〉	ベバシズマブ注 イリノテカン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 150 mg/m ² 80 mg/m ²	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
sLV5FU2+Bevacizumab 〈14〉	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Capecitabine+ Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 カペシタビン	7.5 mg/kg 2000 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
S1+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 80 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (導入療法) 〈14〉	ベバシズマブ注 イリノテカン注 オキサリプラチン注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	1時間30分 1時間 2時間 2時間 48時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチン・レボホリナート 同時投与
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (維持療法) 〈14〉	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	30分 2時間 48時間	1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
TAS102+ Bevacizumab 〈28〉	ベバシズマブ注 トリフルリジン・ チピラシル塩酸塩	5 mg/kg 35 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1,15 1-5,8-12	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
mFOLFOX6+ Bevacizumab(10mg/kg) 〈14〉	ベバシズマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
FOLFIRI+ Bevacizumab(10mg/kg) 〈14〉	ベバシズマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与

大腸がん③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
CPT-11+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	
FOLFIRI+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
mFOLFOX6+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
sLV5FU2+ biweekly Cetuximab 〈14〉	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用	
	ビニメチニブ	90 mg	分2:朝夕食後	連日服用	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (②クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1	
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用	
	ビニメチニブ	90 mg	分2:朝夕食後	連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (①クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	400 mg/m ²	2時間	1	
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (②クール目) 〈7〉	セツキシマブ注	250 mg/m ²	1時間	1	
	エンコラフェニブ	300 mg	分1:朝食後	連日服用	

大腸がん④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
CPT-11+Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	1時間30分	1	
mFOLFOX6+ Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	オキサリプラチン注	85 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
FOLFIRI+Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
sLV5FU+2Panitumumab 〈14〉	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	
FOLFIRI+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注	8 mg/kg	1時間	1	ラムシルマブ： 2回目以降30分に短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
	レボホリナート注	200 mg/m ²	2時間	1	
	イリノテカン注	150 mg/m ²	2時間	1	
	フルオロウラシル注	400 mg/m ²	全開で投与	1	
	フルオロウラシル注	2400 mg/m ²	46時間	1-3	