

## 大腸がん①

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mFOLFOX6 <14>	レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
CAPOX <21>	オキサリプラチン注 カペシタбин	130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
SOX <21>	オキサリプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
FOLFIRI <14>	レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mCAPIRI <21>	イリノテカン注 カペシタбин	200 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	
sLV5FU2 <14>	レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 全開で投与 46時間	1 1 1-3	
FOLFIRI+Aflibercept <14>	アフリベルセプト注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	4 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mFOLFOX6+ Bevacizumab <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
CAPOX+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 オキサリプラチン注 カペシタбин	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SOX+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 オキサリプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FOLFIRI+Bevacizumab <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与

## 大腸がん②

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mCAPIRI+Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 カペシタбин	7.5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SIRB (21)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
sLV5FU2+Bevacizumab (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Capecitabine+ Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注 カペシタбин	7.5 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
S1+Bevacizumab (21)	ベバシズマブ注 テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (導入療法) (14)	ベバシズマブ注 イリノテカン注 オキサリプラチニ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 3200 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 1時間 2時間 2時間 48時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチニ・レボホリナート 同時投与
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (維持療法) (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 3200 mg/m <sup>2</sup>	30分 2時間 48時間	1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FTD/TPI+ Bevacizumab (28)	ベバシズマブ注 トリフルレリジン・ チピラシル塩酸塩	5 mg/kg 35 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 分2:朝夕食後	1,15 1-5,8-12	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可
mFOLFOX6+ Bevacizumab(10mg/kg) (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニ注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチニ 同時投与
FOLFIRI+ Bevacizumab(10mg/kg) (14)	ベバシズマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与

## 大腸がん③

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
biweekly Cetuximab (14)	セツキシマブ注	500 mg/m <sup>2</sup>	2時間	1	
IRI+ biweekly Cetuximab (14)	セツキシマブ注 イリノテカン注	500 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup>	2時間 1時間30分	1 1	
FOLFIRI+ biweekly Cetuximab (14)	セツキシマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mFOLFOX6+ biweekly Cetuximab (14)	セツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与
sLV5FU2+ biweekly Cetuximab (14)	セツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (①クール目) (7)	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	400 mg/m <sup>2</sup> 300 mg 90 mg	2時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (②クール目以降) (7)	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	250 mg/m <sup>2</sup> 300 mg 90 mg	1時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (①クール目) (7)	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	400 mg/m <sup>2</sup> 300 mg	2時間 分1:朝食後	1 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (②クール目以降) (7)	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	250 mg/m <sup>2</sup> 300 mg	1時間 分1:朝食後	1 連日服用	
mFOLFOX6+ Encorafenib+Cetuximab (14)	セツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 エンコラフェニブ	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 300 mg	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間 分1:朝食後	1 1 1 1 1-3 連日服用	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与

## 大腸がん④

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
sLV5FU2+ Encorafenib+Cetuximab (14)	セツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 エンコラフェニブ	500 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 300 mg	2時間 2時間 全開で投与 46時間 分1:朝食後	1 1 1 1-3 連日服用	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
Panitumumab (14)	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
CPT-11+Panitumumab (14)	パニツムマブ注 イリノテカン注	6 mg/kg 150 mg/m <sup>2</sup>	1時間 1時間30分	1 1	
mFOLFOX6+ Panitumumab (14)	パニツムマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
FOLFIRI+Panitumumab (14)	パニツムマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
sLV5FU+Panitumumab (14)	パニツムマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
FOLFIRI+Ramucirumab (14)	ラムシルマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	8 mg/kg 200 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
Ipilimumab+Nivolumab (21)	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1 1	
Nivolumab(q2weeks) (14)	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) (28)	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	