

大腸がん①

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mFOLFOX6 <14>	レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
CAPOX <21>	オキサリプラチン注 カペシタбин	130 mg/m ² 2000 mg/m ²	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
SOX <21>	オキサリプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	130 mg/m ² 80-120 mg/body	2時間 分2:朝夕食後	1 1-14	
FOLFIRI <14>	レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mCAPIRI <21>	イリノテカン注 カペシタбин	200 mg/m ² 1600 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	
sLV5FU2 <14>	レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 全開で投与 46時間	1 1 1-3	
FOLFIRI+Aflibercept <14>	アフリベルセプト注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	4 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mFOLFOX6+ Bevacizumab <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
CAPOX+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 オキサリプラチン注 カペシタбин	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 2000 mg/m ²	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SOX+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 オキサリプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 130 mg/m ² 80-120 mg/body	1時間30分 2時間 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FOLFIRI+Bevacizumab <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与

大腸がん②

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
mCAPIRI+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 イリノテカン注 カペシタбин	7.5 mg/kg 200 mg/m ² 1600 mg/m ²	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
SIRB <21>	ベバシズマブ注 イリノテカン注 テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 150 mg/m ² 80-120 mg/body	1時間30分 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
sLV5FU2+Bevacizumab <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Capecitabine+ Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 カペシタбин	7.5 mg/kg 2000 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
S1+Bevacizumab <21>	ベバシズマブ注 テガフル・ギメラシル・ オテラシルK配合	7.5 mg/kg 80-120 mg/body	1時間30分 分2:朝夕食後	1 1-14	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (導入療法) <14>	ベバシズマブ注 イリノテカン注 オキサリプラチニン注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 150 mg/m ² 85 mg/m ² 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	1時間30分 1時間 2時間 2時間 48時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチニン・レボホリナート 同時投与
FOLFOXIRI+ Bevacizumab (維持療法) <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注	5 mg/kg 200 mg/m ² 3200 mg/m ²	30分 2時間 48時間	1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
FTD/TPI+ Bevacizumab <28>	ベバシズマブ注 トリフルレリジン・ チピラシル塩酸塩	5 mg/kg 35 mg/m ²	1時間30分 分2:朝夕食後	1,15 1-5,8-12	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
mFOLFOX6+ Bevacizumab(10mg/kg) <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可 オキサリプラチニン・レボホリナート 同時投与
FOLFIRI+ Bevacizumab(10mg/kg) <14>	ベバシズマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	10 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間30分 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ベバシズマブ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可 レボホリナート・イリノテカン 同時投与

大腸がん③

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
biweekly Cetuximab <14>	セツキシマブ注	500 mg/m ²	2時間	1	
IRI+ biweekly Cetuximab <14>	セツキシマブ注 イリノテカン注	500 mg/m ² 150 mg/m ²	2時間 1時間30分	1 1	
FOLFI+ biweekly Cetuximab <14>	セツキシマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・イリノテカン 同時投与
mFOLFOX6+ biweekly Cetuximab <14>	セツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与
sLV5FU2+ biweekly Cetuximab <14>	セツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	500 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (1クール目) <7>	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	400 mg/m ² 300 mg 90 mg	2時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Binimetinib+Encorafenib +Cetuximab (2クール目以降) <7>	セツキシマブ注 エンコラフェニブ ビニメチニブ	250 mg/m ² 300 mg 90 mg	1時間 分1:朝食後 分2:朝夕食後	1 連日服用 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (1クール目) <7>	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	400 mg/m ² 300 mg	2時間 分1:朝食後	1 連日服用	
Encorafenib+Cetuximab (2クール目以降) <7>	セツキシマブ注 エンコラフェニブ	250 mg/m ² 300 mg	1時間 分1:朝食後	1 連日服用	
mFOLFOX6+ Encorafenib+Cetuximab <14>	セツキシマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチニン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 エンコラフェニブ	500 mg/m ² 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 300 mg	2時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間 分1:朝食後	1 1 1 1 1-3 連日服用	レボホリナート・オキサリプラチニン 同時投与

大腸がん④

レジメン名 (1クール日数)	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
sLV5FU2+ Encorafenib+Cetuximab <14>	セツキシマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注 エンコラフェニブ	500 mg/m ² 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ² 300 mg	2時間 2時間 全開で投与 46時間 分1:朝食後	1 1 1 1-3 連日服用	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
Panitumumab <14>	パニツムマブ注	6 mg/kg	1時間	1	
CPT-11+Panitumumab <14>	パニツムマブ注 イリノテカン注	6 mg/kg 150 mg/m ²	1時間 1時間30分	1 1	
mFOLFOX6+ Panitumumab <14>	パニツムマブ注 レボホリナート注 オキサリプラチン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 85 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
FOLFIRI+Panitumumab <14>	パニツムマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
sLV5FU+Panitumumab <14>	パニツムマブ注 レボホリナート注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	6 mg/kg 200 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1-3	
FOLFIRI+Ramucirumab <14>	ラムシルマブ注 レボホリナート注 イリノテカン注 フルオロウラシル注 フルオロウラシル注	8 mg/kg 200 mg/m ² 150 mg/m ² 400 mg/m ² 2400 mg/m ²	1時間 2時間 2時間 全開で投与 46時間	1 1 1 1 1-3	ラムシルマブ： 2回目以降30分に短縮可 レボホリナート・オキサリプラチン 同時投与
Ipilimumab+Nivolumab <21>	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1 1	
Nivolumab(q2weeks) <14>	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) <28>	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	