

非小細胞肺癌①

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
PEM 〈21〉	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
DTX 〈21〉	ドセタキセル注	60 mg/m ²	1時間	1	
weeklynabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
GEM 〈28〉	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8,15	
VNR 〈28〉	ビノレルビン注	25 mg/m ²	全開で自然滴下	1,8,15	
weeklyIRI 〈28〉	イリノテカン注	100 mg/m ²	1時間30分	1,8,15	
AMR 〈28〉	アムルビシン注	45 mg/m ²	全開で自然滴下	1,2,3	
T-DXd 〈21〉	トラスツズマブ デルクステカン注	5.4 mg/kg	1時間30分	1	トラスツズマブデルクステカン: 2回目以降30分に短縮可
CBDCA+PEM 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/m ² AUC=6	10分	1	
			1時間	1	
CBDCA+PTX 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/m ² AUC=5	3時間	1	
			1時間	1	
CBDCA +weeklynabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	100 mg/m ² AUC=6	30分	1,8,15	
			1時間	1	
CBDCA+DTX 〈21〉	ドセタキセル注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間	1	
			1時間	1	
CBDCA+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 カルボプラチン注	1000 mg/m ² AUC=5	30分	1,8	
			1時間	1	
CBDCA+VNR 〈21〉	ビノレルビン注 カルボプラチン注	25 mg/m ² AUC=5	全開で自然滴下	1,8	
			1時間	1	
CBDCA+IRI 〈28〉	イリノテカン注 カルボプラチン注	60 mg/m ² AUC=5	1時間30分	1,8,15	
			1時間	1	
CBDCA+S1 〈21〉	カルボプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 80-120 mg/body	1時間 分2:朝夕食後	1 1-14	

非小細胞肺がん②

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/m ² 75 mg/m ²	10分 1時間	1 1	
CDDP+GEM (short-hydration) 〈21〉	ゲムシタビン注 シスプラチン注	1000 mg/m ² 80 mg/m ²	30分 1時間	1,8 1	
CDDP+VNR (short-hydration) 〈21〉	ビノレルビン注 シスプラチン注	25 mg/m ² 80 mg/m ²	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CDDP+S1 (short-hydration) 〈35〉	シスプラチン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	60 mg/m ² 80-120 mg/body	1時間 分2: 朝夕食後	8 1-21 (3投2休)	
Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
PEM+Bevacizumab 〈21〉	ペメトレキセド注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² 15 mg/kg	10分 1時間30分	1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Gefitinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 ゲフィチニブ	15 mg/kg 250 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
DTX+Bevacizumab 〈21〉	ドセタキセル注 ベバシズマブ注	50 mg/m ² 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Afatinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 アファチニブ	15 mg/kg 40 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Erlotinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 エルロチニブ	15 mg/kg 150 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
weeklynabPTX+ Bevacizumab 〈21〉	nabパクリタキセル注 ベバシズマブ注	100 mg/m ² 15 mg/kg	30分 1時間30分	1,8,15 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PTX+ Bevacizumab 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	200 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	3時間 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PEM+ Bevacizumab 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+S1+ Bevacizumab 〈21〉	カルボプラチン注 ベバシズマブ注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	AUC=5 15 mg/kg 80-120 mg/body	1時間 1時間30分 分2: 朝夕食後	1 1 1-14	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+weeklynabPTX+ Bevacizumab 〈21〉	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	100 mg/m ² AUC=6 15 mg/kg	30分 1時間 1時間30分	1,8,15 1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可

非小細胞肺癌③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM+ Bevacizumab (short-hydration) 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/m ² 75 mg/m ² 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CDDP+GEM+ Bevacizumab (short-hydration) 〈21〉	ゲムシタビン注 シスプラチン注 ベバシズマブ注	1000 mg/m ² 80 mg/m ² 15 mg/kg	30分 1時間 1時間30分	1,8 1 1	ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
DTX+Ramucirumab 〈21〉	ラムシルマブ注 ドセタキセル注	10 mg/kg 60 mg/m ²	1時間 1時間	1 1	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
Gefitinib+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注 ゲフィチニブ	10 mg/kg 250 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
Erlotinib+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注 エルロチニブ	10 mg/kg 150 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ラムシルマブ: 2回目以降30分に短縮可
CDDP+PEM+ Osimertinib (short-hydration) 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注 オシメルチニブ	500 mg/m ² 75 mg/m ² 80 mg/body	10分 1時間 1日1回	1 1 連日服用	
CBDCA+PEM+ Osimertinib 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 オシメルチニブ	500 mg/m ² AUC=5 80 mg/body	10分 1時間 1日1回	1 1 連日服用	
PEM+ Osimertinib 〈21〉	ペメトレキセド注 オシメルチニブ	500 mg/m ² 80 mg/body	10分 1日1回	1 連日服用	
CDDP+GEM+ Necitumumab (short-hydration) 〈21〉	ネシツムマブ注 ゲムシタビン注 シスプラチン注	800 mg/body 1250 mg/m ² 75 mg/m ²	1時間 30分 1時間	1,8 1,8 1	
Necitumumab (維持療法) 〈21〉	ネシツムマブ注	800 mg/body	1時間	1,8	
Amivantamab(皮下) +Lazertinib (1クール目80kg未満) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	1600 mg/body 20000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,8,15,22 連日服用	
Amivantamab(皮下) +Lazertinib (1クール目80kg以上) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	2240 mg/body 28000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,8,15,22 連日服用	

非小細胞肺がん④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Amivantamab(皮下) +Lazertinib (2クール目以降80kg未満) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	1600 mg/body 20000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,15 連日服用	
Amivantamab(皮下) +Lazertinib (2クール目以降80kg以上) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	2240 mg/body 28000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,15 連日服用	
S1+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 テガフル・キメラシル・ オテラシルK配合	1000 mg/m ² 60-100 mg/body	30分 分2:朝夕食後	8,15 1-14	
GEM+VNR 〈28〉	ビノレルビン注 ゲムシタビン注	25 mg/m ² 1000 mg/m ²	全開で自然滴下 30分	1.8,15 1.8,15	
Nivolumab(q2weeks) 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) 〈28〉	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab(q3weeks) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab(q6weeks) 〈42〉	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	30分	1	
Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
Durvalumab 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
Ipilimumab+ Nivolumab(q2weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Ipilimumab+ Nivolumab(q3weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法1) 〈56〉	デュルバルマブ注 トレメリムマブ注	1500 mg/body 75 mg/body	1時間 1時間	1,29 29	1クール施行後は維持療法2 へ デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法2) 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg

非小細胞肺がん⑤

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+weeklynabPTX+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CBDCA+PEM+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=5	1時間	1	
CDDP+PEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
PEM+Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
術前CDDP+GEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
	ゲムシタビン注	1000 mg/m ²	30分	1,8	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
CBDCA+PTX+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m ²	3時間	1,22	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1,22	
CBDCA+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1,22	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1,22	
CDDP+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab (short-hydration) 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1,22	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1,22	
術前CBDCA+PTX +Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m ²	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
術前CBDCA+PEM+ Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
術前CDDP+PEM+ Nivolumab (short-hydration) 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	

非小細胞肺癌⑥

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+weeklynabPTX +Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
ABCP 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
	パクリタキセル注	175 mg/m ²	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CDDP+PEM+ Atezolizumab (short-hydration) 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	
CBDCA+PEM+ Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
PEM+Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
Atezolizumab +Bevacizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	アテゾリズマブ: 2回目以降30分に短縮可 ベバシズマブ: 2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
CBDCA+weeklynabPTX +Durvalumab +Tremelimumab 〈21〉	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4クール施行後は維持療 法1へ デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	nabパクリタキセル注	100 mg/m ²	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CBDCA+PEM +Durvalumab +Tremelimumab 〈21〉	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4クール施行後は維持療 法1へ デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC=6	1時間	1	
CDDP+PEM+Durvalumab +Tremelimumab (short-hydration) 〈21〉	トレメリムマブ注	75 mg/body	1時間	1	4クール施行後は維持療 法1へ デュルバルマブ: 体重≤30kg の場合20mg/kg
	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m ²	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m ²	1時間	1	