非小細胞肺がん①

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
PEM 〈21〉	ペメトレキセド注	500 mg/㎡	10分	1	
DTX 〈21〉	ドセタキセル注	60 mg/㎡	1時間	1	
weeklynabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注	100 mg/㎡	30分	1,8,15	
GEM 〈28〉	ゲムシタビン注	1000 mg/㎡	30分	1,8,15	
VNR 〈28〉	ビノレルビン注	25 mg/㎡	全開で自然滴下	1,8,15	
weeklyIRI 〈28〉	イリノテカン注	100 mg/㎡	1時間30分	1,8,15	
AMR 〈28〉	アムルビシン注	45 mg/㎡	全開で自然滴下	1,2,3	
T-DXd 〈21〉	トラスツズマブ デルクステカン注	5.4 mg/kg	1時間30分	1	ﾄﾗｽﾂｽﾞﾏﾌﾞﾃﾞﾙｸｽﾃｶﾝ: 2回目以降30分に短縮可
CBDCA+PEM 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注	500 mg/㎡ AUC＝6	10分 1時間	1 1	
CBDCA+PTX 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/㎡ AUC＝5	3時間 1時間	1 1	
CBDCA +weeklynabPTX 〈21〉	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	100 mg/㎡ AUC＝6	30分 1時間	1,8,15 1	
CBDCA+DTX 〈21〉	ドセタキセル注 カルボプラチン注	60 mg/㎡ AUC＝5	1時間 1時間	1 1	
CBDCA+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 カルボプラチン注	1000 mg/㎡ AUC＝5	30分 1時間	1,8 1	
CBDCA+VNR 〈21〉	ビノレルビン注 カルボプラチン注	25 mg/㎡ AUC＝5	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CBDCA+IRI 〈28〉	イリノテカン注 カルボプラチン注	60 mg/㎡ AUC＝5	1時間30分 1時間	1,8,15 1	
CBDCA+S1 〈21〉	カルボプラチン注 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ ｵﾃﾗｼﾙK配合	AUC＝5 80-120 mg/body	1時間 分2:朝夕食後	1 1-14	

2026.10現在

非小細胞肺がん②

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM (short-hydration) 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注	500 mg/㎡ 75 mg/㎡	10分 1時間	1 1	
CDDP+GEM (short-hydration) 〈21〉	ゲムシタビン注 シスプラチン注	1000 mg/㎡ 80 mg/㎡	30分 1時間	1,8 1	
CDDP+VNR (short-hydration) 〈21〉	ビノレルビン注 シスプラチン注	25 mg/㎡ 80 mg/㎡	全開で自然滴下 1時間	1,8 1	
CDDP+S1 (short-hydration) 〈35〉	シスプラチン注 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ ｵﾃﾗｼﾙK配合	60 mg/㎡ 80-120 mg/body	1時間 分2:朝夕食後	8 1-21 (3投2休)	
Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
PEM+Bevacizumab 〈21〉	ペメトレキセド注 ベバシズマブ注	500 mg/㎡ 15 mg/kg	10分 1時間30分	1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Gefitinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 ゲフィチニブ	15 mg/kg 250 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
DTX+Bevacizumab 〈21〉	ドセタキセル注 ベバシズマブ注	50 mg/㎡ 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Afatinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 アファチニブ	15 mg/kg 40 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
Erlotinib+Bevacizumab 〈21〉	ベバシズマブ注 エルロチニブ	15 mg/kg 150 mg/body	1時間30分 1日1回	1 連日服用	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
weeklynabPTX+ Bevacizumab 〈21〉	nabパクリタキセル注 ベバシズマブ注	100 mg/㎡ 15 mg/kg	30分 1時間30分	1,8,15 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PTX+ Bevacizumab 〈21〉	パクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	200 mg/㎡ AUC＝6 15 mg/kg	3時間 1時間 1時間30分	1 1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+PEM+ Bevacizumab 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/㎡ AUC＝6 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+S1+ Bevacizumab 〈21〉	カルボプラチン注 ベバシズマブ注 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ ｵﾃﾗｼﾙK配合	AUC＝5 15 mg/kg 80-120 mg/body	1時間 1時間30分 分2:朝夕食後	1 1 1-14	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+weeklynabPTX+ Bevacizumab 〈21〉	nabパクリタキセル注 カルボプラチン注 ベバシズマブ注	100 mg/㎡ AUC＝6 15 mg/kg	30分 1時間 1時間30分	1,8,15 1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可

2026.10現在

非小細胞肺がん③

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CDDP+PEM+ Bevacizumab （short-hydration） 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注 ベバシズマブ注	500 mg/㎡ 75 mg/㎡ 15 mg/kg	10分 1時間 1時間30分	1 1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ：2回目60分， 3回目以降30分短縮可
CDDP+GEM+ Bevacizumab （short-hydration） 〈21〉	ゲムシタビン注 シスプラチン注 ベバシズマブ注	1000 mg/㎡ 80 mg/㎡ 15 mg/kg	30分 1時間 1時間30分	1,8 1 1	ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ：2回目60分， 3回目以降30分短縮可
DTX+Ramucirumab 〈21〉	ラムシルマブ注 ドセタキセル注	10 mg/kg 60 mg/㎡	1時間 1時間	1 1	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ： 2回目以降30分に短縮可
Gefitinib+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注 ゲフィチニブ	10 mg/kg 250 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ： 2回目以降30分に短縮可
Erlotinib+Ramucirumab 〈14〉	ラムシルマブ注 エルロチニブ	10 mg/kg 150 mg/body	1時間 1日1回	1 連日服用	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ： 2回目以降30分に短縮可
CDDP+PEM+ Osimertinib （short-hydration） 〈21〉	ペメトレキセド注 シスプラチン注 オシメルチニブ	500 mg/m^2 75 mg/m^2 80 mg/body	10分 1時間 1日1回	1 1 連日服用	
CBDCA+PEM+ Osimertinib 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 オシメルチニブ	500 mg/m^2 AUC＝5 80 mg/body	10分 1時間 1日1回	1 1 連日服用	
PEM+ Osimertinib 〈21〉	ペメトレキセド注 オシメルチニブ	500 mg/m^2 80 mg/body	10分 1日1回	1 連日服用	
CDDP+GEM+ Necitumumab （short-hydration） 〈21〉	ネシツムマブ注 ゲムシタビン注 シスプラチン注	800 mg/body 1250 mg/㎡ 75 mg/㎡	1時間 30分 1時間	1,8 1,8 1	
Necitumumab （維持療法） 〈21〉	ネシツムマブ注	800 mg/body	1時間	1,8	
Amivantamab(皮下注) +Lazertinib （1ｸｰﾙ目80kg未満） 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	1600 mg/body 20000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,8,15,22 連日服用	
Amivantamab(皮下注) +Lazertinib （1ｸｰﾙ目80kg以上） 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	2240 mg/body 28000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,8,15,22 連日服用	

2026.10現在

非小細胞肺がん④

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Amivantamab(皮下注) +Lazertinib (2ｸｰﾙ目以降80kg未満) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	1600 mg/body 20000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,15 連日服用	
Amivantamab(皮下注) +Lazertinib (2ｸｰﾙ目以降80kg以上) 〈28〉	アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ ラゼルチニブ	2240 mg/body 28000 単位/body 240 mg/body	5分 1日1回	1,15 連日服用	
CBDCA+PEM +Amivantamab(皮下注) (1ｸｰﾙ目80kg未満) 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ AUC＝5 1600 mg/body 20000 単位/body	10分 1時間 5分	1 1 1,8,15	day8,15はｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ 2400mg/body （ボルヒアルロニダーゼアルファ30000単位/body）に変更
CBDCA+PEM +Amivantamab(皮下注) (1ｸｰﾙ目80kg以上) 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ AUC＝5 2240 mg/body 28000 単位/body	10分 1時間 5分	1 1 1,8,15	day8,15はｱﾐﾊﾞﾝﾀﾏﾌﾞ 3360mg/body （ボルヒアルロニダーゼアルファ42000単位/body）に変更
CBDCA+PEM +Amivantamab(皮下注) (2ｸｰﾙ目以降80kg未満) 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ AUC＝5 2400 mg/body 30000 単位/body	10分 1時間 5分	1 1 1	
CBDCA+PEM +Amivantamab(皮下注) (2ｸｰﾙ以降目80kg以上) 〈21〉	ペメトレキセド注 カルボプラチン注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ AUC＝5 3360 mg/body 42000 単位/body	10分 1時間 5分	1 1 1	
PEM+Amivantamab (皮下注)(80kg未満) 〈21〉	ペメトレキセド注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ 2400 mg/body 30000 単位/body	10分 5分	1 1	
PEM+Amivantamab (皮下注)(80kg以上) 〈21〉	ペメトレキセド注 アミバンタマブ注 ボルヒアルロニダーゼアルファ	500 mg/㎡ 3360 mg/body 42000 単位/body	10分 5分	1 1	
S1+GEM 〈21〉	ゲムシタビン注 ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾃﾗｼﾙK配合	1000 mg/㎡ 60-100 mg/body	30分 分2：朝夕食後	8,15 1-14	
GEM+VNR 〈28〉	ビノレルビン注 ゲムシタビン注	25 mg/㎡ 1000 mg/㎡	全開で自然滴下 30分	1,8,15 1,8,15	
Nivolumab(q2weeks) 〈14〉	ニボルマブ注	240 mg/body	30分	1	
Nivolumab(q4weeks) 〈28〉	ニボルマブ注	480 mg/body	30分	1	

2026.10現在

非小細胞肺がん⑤

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Pembrolizumab(q3weeks) 〈21〉	ペムブロリズマブ注	200 mg/body	30分	1	
Pembrolizumab(q6weeks) 〈42〉	ペムブロリズマブ注	400 mg/body	30分	1	
Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可
Durvalumab 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kg の場合20mg/kg
Ipilimumab+ Nivolumab(q2weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	240 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,15,29 1	
Ipilimumab+ Nivolumab(q3weeks) 〈42〉	ニボルマブ注 イピリムマブ注	360 mg/body 1 mg/kg	30分 30分	1,22 1	
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法1) 〈56〉	デュルバルマブ注 トレメリムマブ注	1500 mg/body 75 mg/body	1時間 1時間	1,29 29	1ｸｰﾙ施行後は維持療法2へ ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kg の場合20mg/kg
Durvalumab +Tremelimumab (維持療法2) 〈28〉	デュルバルマブ注	1500 mg/body	1時間	1	ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kg の場合20mg/kg
CBDCA+weeklynabPTX+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注 nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	200 mg/body 100 mg/m^2 AUC＝6	30分 30分 1時間	1 1,8,15 1	
CBDCA+PEM+ Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注 カルボプラチン注	200 mg/body 500 mg/m^2 AUC＝5	30分 10分 1時間	1 1 1	
CDDP+PEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	200 mg/body 500 mg/m^2 75 mg/m^2	30分 10分 1時間	1 1 1	
PEM+Pembrolizumab 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ペメトレキセド注	200 mg/body 500 mg/m^2	30分 10分	1 1	
術前CDDP+GEM+ Pembrolizumab (short-hydration) 〈21〉	ペムブロリズマブ注 ゲムシタビン注 シスプラチン注	200 mg/body 1000 mg/㎡ 75 mg/㎡	30分 30分 1時間	1 1,8 1	

非小細胞肺がん⑥

2026.10現在

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
CBDCA+PTX+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m^2	3時間	1,22	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1,22	
CBDCA+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1,22	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1,22	
CDDP+PEM+ Ipilimumab+Nivolumab （short-hydration） 〈42〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1,22	
	イピリムマブ注	1 mg/kg	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1,22	
	シスプラチン注	75 mg/m^2	1時間	1,22	
術前CBDCA+PTX +Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	パクリタキセル注	200 mg/m^2	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1	
術前CBDCA+PEM+ Nivolumab 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1	
術前CDDP+PEM+ Nivolumab （short-hydration） 〈21〉	ニボルマブ注	360 mg/body	30分	1	
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m^2	1時間	1	
CBDCA+weeklynabPTX +Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可
	nabパクリタキセル注	100 mg/m^2	30分	1,8,15	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1	
ABCP 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可 ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
	ベバシズマブ注	15 mg/kg	1時間30分	1	
	パクリタキセル注	175 mg/m^2	3時間	1	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1	
CDDP+PEM+ Atezolizumab （short-hydration） 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1	
	シスプラチン注	75 mg/m^2	1時間	1	
CBDCA+PEM+ Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1	
	カルボプラチン注	AUC＝6	1時間	1	
PEM+Atezolizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注	1200 mg/body	1時間	1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可
	ペメトレキセド注	500 mg/m^2	10分	1	

2026.10現在

レジメン名 〈1クール日数〉	薬品名	投与量	点滴時間 用法	投与日(day)	備考
Atezolizumab +Bevacizumab 〈21〉	アテゾリズマブ注 ベバシズマブ注	1200 mg/body 15 mg/kg	1時間 1時間30分	1 1	ｱﾃｿﾞﾘｽﾞﾏﾌﾞ: 2回目以降30分に短縮可 ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ:2回目60分, 3回目以降30分短縮可
CBDCA+weeklynabPTX +Durvalumab +Tremelimumab 〈21〉	トレメリムマブ注 デュルバルマブ注 nabパクリタキセル注 カルボプラチン注	75 mg/body 1500 mg/body 100 mg/m^2 AUC＝6	1時間 1時間 30分 1時間	1 1 1,8,15 1	4クール施行後は維持療法1へ ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kgの場合20mg/kg
CBDCA+PEM +Durvalumab +Tremelimumab 〈21〉	トレメリムマブ注 デュルバルマブ注 ペメトレキセド注 カルボプラチン注	75 mg/body 1500 mg/body 500 mg/m^2 AUC＝6	1時間 1時間 10分 1時間	1 1 1 1	4クール施行後は維持療法1へ ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kgの場合20mg/kg
CDDP+PEM+Durvalumab +Tremelimumab （short-hydration） 〈21〉	トレメリムマブ注 デュルバルマブ注 ペメトレキセド注 シスプラチン注	75 mg/body 1500 mg/body 500 mg/m^2 75 mg/m^2	1時間 1時間 10分 1時間	1 1 1 1	4クール施行後は維持療法1へ ﾃﾞｭﾙﾊﾞﾙﾏﾌﾞ:体重≦30kgの場合20mg/kg

2026.10現在