

ソケイヘルニア根治術を受けられる

様

病名

主治医:

受持ち看護師:

患者様用

項目	月日	入院当日(術前日)	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	手術後1日目	退院日
処置・薬剤 (点滴・内服)		<ul style="list-style-type: none"> 21時に下剤内服 21時に安定剤内服(希望時) 	<ul style="list-style-type: none"> 医師の指示があれば、7時に内服 ()時に浣腸 ()時に点滴(点滴までに更衣をすませておいてください) ()時に手術室に行きます 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後は()に帰ります 手術後は心電図モニターや酸素マスクがついた状態で帰ってきます 	<ul style="list-style-type: none"> 医師にてガーゼ交換 状態により医師の診察後、酸素や点滴を終了するか決定 朝までで点滴終了 	<ul style="list-style-type: none"> 医師にてガーゼ交換があります
排泄			<ul style="list-style-type: none"> 便の性状を観察するので流さず教えてください 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後は膀胱に管が入っています 	<ul style="list-style-type: none"> 十分歩けることを確認できれば尿管を抜きます 	
検査		<ul style="list-style-type: none"> 心電図、胸部レントゲン、採血 身長、体重測定 麻酔科受診 				
安静度		<ul style="list-style-type: none"> フリー 	<ul style="list-style-type: none"> 手術の時間まで点滴台を持って歩くことができます 	<ul style="list-style-type: none"> ベッド上安静 	<ul style="list-style-type: none"> フリー 	
食事			<ul style="list-style-type: none"> 0時以降絶食 ()時以降絶飲食 	<ul style="list-style-type: none"> 許可ができれば水分摂取可 夕食18時もしくは19時(お粥) 	<ul style="list-style-type: none"> 常食 	
清潔		<ul style="list-style-type: none"> 臍のごま取り・ソケイ部剃毛後、シャワー 女性の方はマニキュアをとりましょう 爪切り 	<ul style="list-style-type: none"> 男性は髭剃り 		<ul style="list-style-type: none"> シャワー 	
患者様及びご家族への説明 栄養指導 服薬指導		<ul style="list-style-type: none"> 手術について医師から説明 入院生活、手術について看護師から説明 手術の必要物品 平たいオムツ1枚・バスタオル1枚を用意 ※売店で購入できます 普段内服している薬があれば、主治医か看護師に渡してください 	<ul style="list-style-type: none"> 女性の方はお化粧品や口紅は顔色が分からなくなるので、控えてください 義歯、コンタクトレンズ、メガネ、時計、ピアス、ネックレス、指輪などの貴重品、貴金属ははずして、ご家族の方が保管してください <p><ご家族の方へ></p> <ul style="list-style-type: none"> 手術当日は、手術室入室30分前には病室においでください 患者様が手術室に入られた後、デイルームで手術が終わるまで待機してください 	<ul style="list-style-type: none"> 麻酔が覚めると痛みや吐き気、頭痛があることがあります。我慢することはかえってお体によくありません。 主治医・看護師に必ず伝えてください <p><ご家族の方へ></p> <ul style="list-style-type: none"> 手術後は医師から手術について説明があります 	<p><退院おめでとうございます></p> <ul style="list-style-type: none"> 定期受診日にはかならず受診しましょう。それ以外でも、体調が悪かったりおかしなときはには受診してください 夜間、休日に具合が悪くなったときはには、まず病院にお電話ください <p>神戸赤十字病院 078-231-6006</p> 	<p>〔退院後の注意点〕</p> <ul style="list-style-type: none"> 傷口に貼ってあるテープがはがれた時は、バンドエイドを貼るなど傷を保護しておけば問題ありません。 日常生活は手術前と同じでかまいません 創の突っ張る感じは次第に気にならないようになりますが、あまり気になるようでしたら主治医にご相談してください 仕事復帰は体調が整い次第いつでもかまいません。ご心配な方は主治医にご相談してください 力仕事、スポーツは手術後2週間ぐらいしてから、少しずつ始めてください <p>なんでも ご相談 下さい</p> 

◇ 総合的機能評価

神戸赤十字病院 外科

パス管理番号：11-006

2021. 2月改定